

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST (Tél. Arras 23-14)

(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux.

C. C. P. : LILLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

SUPPLEMENT n° 1

n° VII - Avril 1961

CULTURES FRUITIÈRES

## AVERTISSEMENTS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER : Des contaminations assez importantes ont pu avoir lieu du 3 au 11 avril. Elles ont été bien contrôlées par les traitements conseillés fin mars et le 7 avril. Mais la végétation évolue rapidement et les produits sont fréquemment lavés. La protection devant être assurée avec soin, il convient donc, dans tous les vergers non traités depuis le 10 avril d'effectuer une nouvelle pulvérisation soignée dès réception de cet avis. Cette année, il est nécessaire d'intervenir si besoin est entre deux averses et de renouveler l'opération après de fortes pluies orageuses, à moins qu'il n'y ait une certitude de temps sec à venir.

HOPLOCAMPES : Ce sont surtout les hoplocampes des pommes qui sont à craindre dans notre région. Le vol a débuté, et il conviendra, dans les vergers sensibles, d'effectuer un traitement, avec un produit à base de H.C.H. ou de lindane ou de parathion, dès la chute des pétales.

## INFORMATIONS

CULTURES FRUITIÈRES

CHARANCONS - CHENILLES : Bien surveiller ces insectes dont l'activité s'intensifie.

PUCERONS - ACARIENS : Sauf dans le cas d'attaque de puceron vert du pommier (surtout dans les vergers non traités au débourrement) les traitements contre ces ravageurs semblent prématurés. Cependant, en situation chaude (Seine-Maritime surtout) surveiller les vergers envahis d'oeufs d'araignée rouge afin de traiter lorsque l'éclosion des oeufs sera totale.

OIDIUM DU POMMIER : Faute de données scientifiques suffisantes, la Station ne peut émettre des conseils à ce sujet. Actuellement, seule la taille systématique et l'élimination des pousses oïdiées semblent un moyen de lutte assez efficace. De plus, les fabricants de produits peuvent vous conseiller des programmes de lutte adaptés aux spécialités qu'ils commercialisent.

GRANDES CULTURES

SITONE DU POIS : Le traitement ne se justifie qu'en cas de végétation ralentie juste après la levée. Employer alors, si besoin est, un produit à base de D.D.T. ou de lindane.

ALTISES DU LIN : Compte tenu que la majorité des semences ont subi un arrosage et que les conditions climatiques actuelles favorisent plus la levée du lin que ces insectes, les traitements contre les altises semblent superflus.

MELIGETHES DU COLZA : Les dégâts dus à cet insecte ne seront surtout à craindre cette année que dans les cultures les plus en retard. Surveiller ces dernières si la végétation est ralentie et traiter alors en cas de forte pullulation avant la floraison.

CHARANCON DES SILIQUES DU COLZA - PEGOMYIE DE LA BETTERAVE : Les adultes sont apparus, mais tout traitement est prématuré dans l'immédiat.

Le Contrôleur Chargé des  
Avertissements Agricoles,

R. DIVOUX

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux,

P. COUTURIER